

Bu broşür toraks hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Bebeğimin Göğsünü (Toraks) Görüntülemek İçin En İyi Zaman Hangisidir?

Rutin bir orta trimester ultrason taraması genellikle gebeliğin 18 ila 22. haftaları arasında yapılır ve asıl amaç büyüme anormalliklerini tespit etmek için fetal ölçümler yapmak ve malformasyonları saptamaktır.

Bebeğimin Göğsünde Ne Değerlendirilmelidir?

Rutin orta trimester kontrollerinde akciğerler, kalp ve diyafram kası değerlendirilecektir. Ayrıca göğüs kafesi ve kaburgaların şekli not edilecektir.

Göğüs Değerlendirmesi Orta Trimesterde Nasıl Yapılır?

İkinci veya üçüncü trimester ultrasonunda, muayene eden kişi göğüs şeklini, kaburgaların eğriliğini, her iki akciğerin simetrisini, kitlelerin var olup olmadığını ve göğüs kafesini karından ayıran diyaframın bütünlüğünü değerlendirecek; mide ve karaciğerin normal pozisyonuna dikkat edecektir. Kalp de değerlendirilir. Rutin taramada herhangi bir göğüs yapısında alışılmadık yapısal farklılıklar tespit edilirse, diğer sistemlerdeki ek anormallikleri ekarte etmek için bebeğin daha ayrıntılı bir muayenesi gerekecektir. İkinci trimester değerlendirmesinin ardından, doktorunuz size farklılıkların doğası ve bebeğin prognozu hakkında bilgi verecektir. Çoğu durumda, göğüs boşluğunun ve iç yapıların büyümesini ve herhangi bir alışılmadık bulgunun evrimini değerlendirmek için bu yapıların üçüncü trimesterde seri değerlendirmesi önerilecektir.

Son Güncelleme Nisan 2024