

# 宫颈峡部妊娠 (CIP)

患者信息系列-你应该知道些什么, 你应该问些什么。

## 什么是宫颈峡部妊娠 (Cervico-isthmic pregnancy, CIP) ?

CIP 是指妊娠囊在异常位置-峡部 (宫体和宫颈之间的区域-图 1) 着床并发育而发生的妊娠。正常妊娠发生在子宫底部, 这更适合胎儿的正常生长 (图 2)。



图1- CIP (胚胎位于峡部) 1-宫颈; 2-孕囊 (峡部); 3-宫底



图2-正常妊娠 1-宫颈; 2宫底孕囊

## CIP 对于母亲有什么风险?

CIP 是一种非常高风险的妊娠。它与妊娠期间和分娩时的出血有关, 这种出血可能非常多并且可能危及生命。一般认为发生这种情况有两个原因。首先, 峡部不像子宫的其他部分一样有收缩功能, 这种收缩功能可使分娩后流血停止。其次, 在几乎所有 CIP 病例中, 胎盘都异常地粘附在子宫上 (称为胎盘植入谱系疾病), 不能轻易分离, 如果剥除, 会导致严重出血。由于这种并发症, 大多数超过 20 周的 CIP 病例需要在分娩后进行子宫切除术 (切除子宫), 以起到止血和保护母亲的生命作用。

## CIP 对于胎儿的风险是什么?

CIP 对婴儿的风险与早产有关, 即过早出生。在正常妊娠中, 宫颈在妊娠结束前保持闭合状态。在 CIP 中, 妊娠生长在宫颈附近并对其施加压力, 导致其缩短并在妊娠早期呈现开放状态。如果这样的情况发生在妊娠 24 周之前, 胎儿可能无法存活。如果这样的情况发生在 24 周之后, 如果婴儿是超/极早产儿, 可能会出现并发症。

# 宫颈峡部妊娠 (CIP)

患者信息系列-你应该知道些什么, 你应该问些什么。

## 怀孕期间需要注意什么?

根据您所在国家的立法, 考虑到 CIP 的并发症和预后, 您可能会被要求终止妊娠。如果夫妻双方决定继续妊娠, 重要的是要谨记, 可能会出现大出血或早产 (会出现规律的宫缩痛)。超声可用于监测宫内妊娠的进展、宫颈的长度以及胎盘异常粘连的可能性。其他检查, 如 MRI 可能会有帮助。

## 分娩过程中会发生什么?

如果胎盘附着于子宫的位置似乎发生异常, 对于母亲来说最安全的手术方式是在婴儿出生后切除子宫, 而不是尝试切除胎盘。考虑到失血可能非常严重, 分娩应由多学科团队进行。夫妻双方应为切除子宫的可能性做好准备, 如果出血不能得到适当控制, 这是最有可能发生的情况。

### 我还应该问什么其他问题?

- 我此次妊娠属于 CIP 还是宫颈妊娠?
- 如果我决定继续妊娠会有什么风险?
- 胎盘是否会发生异常粘连?
- 我会失去子宫吗?
- 如果我的宝宝发生了早产会发生什么?

翻译: 郭晓霞 审校: 陈敏

最后更新时间: 2022 年 12 月