

什么是宫颈结核？

结核或 TB 是一种可以影响身体任何部位的细菌，但最常影响肺脏。肺脏的原发感染称为肺结核。在某些情况下，TB 感染会通过血液传播到身体的其他部位。当细菌到达生殖道时，会导致生殖器结核或盆腔 TB。

宫颈 TB 是如何发生的？

患有肺结核的妇女如果不进行治疗，最终会发展为子宫和盆腔 TB。宫颈生殖器结核也可能通过与感染者的性接触传播。

宫颈和生殖器 TB 一般有什么症状？

生殖器 TB 通常是一种隐性感染，没有明显症状，因为细菌可能会在体内潜伏长达 10 到 20 年。但是，需要注意的一些症状包括：

1. 月经不调
2. 盆腔痛
3. 阴道分泌物带血或持续、大量、变色
4. 性交后出血
5. 不孕

有时缺乏症状使生殖器结核难以诊断。根据您的症状，医生可能会建议您进行相应检查以明确诊断。

生殖器 TB 如何影响生育能力？

女性生殖器或盆腔 TB 通常会影响到输卵管，导致输卵管阻塞，并且无法逆转。如果早期诊断出 TB 并治疗感染，子宫或输卵管的损伤可能会治愈。

如果长期不治疗，输卵管、卵巢和子宫 TB 可能无法治愈并造成瘢痕。子宫瘢痕通常会导致月经稀少。在某些情况下，月经可能会完全停止，因为子宫内膜可能受到严重影响。不幸的是，在这些情况下，女性可能无法怀孕。

如何治疗宫颈结核和/或生殖器 TB？

生殖器 TB 的治疗与肺结核或任何其他形式的 TB 相同。需要持续约 6 到 8 个月的抗生素治疗。完成整个疗程很重要。

2022 年 8 月更新